

LE DIABÈTE EXISTE DÈS L'ENFANCE ET PEUT ENTRAÎNER UN COMA

REPÉRONS LES SIGNES DU DIABÈTE DE TYPE 1 AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD :

- ✕ Votre enfant va aux toilettes très souvent
- ✕ Il refait pipi au lit
- ✕ Et il boit beaucoup plus que d'habitude

Consultez d'urgence un professionnel de santé

LE DIABÈTE DE TYPE 1 DES ENFANTS, L'ESSENTIEL À RETENIR

83 % des parents d'enfants de moins de 14 ans déclarent se sentir mal informés sur le diabète de type 1 des enfants¹.



Durant la consultation

Lors de la **consultation avec un professionnel de santé** (pédiatre, médecin généraliste, pharmacien...), celui-ci va tout d'abord réaliser l'**examen clinique** et revoir avec vous les principaux signes d'alerte et les symptômes du diabète de type 1. Une fois cet examen clinique réalisé, le professionnel de santé peut **confirmer son diagnostic** en recherchant :

La glycémie (le taux de sucre dans le sang) avec une goutte de sang au bout du doigt sur une bandelette, quel que soit le moment de la journée.

OU

La glycosurie (le taux de sucre dans les urines) avec une bandelette urinaire (et éventuellement la cétonurie).

Dès le diagnostic confirmé, le professionnel de santé doit adresser sans délai votre enfant aux urgences pédiatriques hospitalières les plus proches afin qu'il bénéficie d'une prise en charge adaptée.



Les conséquences d'un diagnostic tardif du diabète de type 1

- **Diagnostiqué trop tard**, votre enfant peut se retrouver en **situation d'acidocétose**.
- L'acidocétose est une complication **grave du diabète**.
- Au moment du diagnostic du diabète de type 1, **4 enfants sur 10 présentent une acidocétose** modérée ou sévère, associée à un coma dans 5% des cas.

L'évolution vers l'acidocétose est d'autant plus rapide que l'enfant est plus jeune.

¹ Sondage Opinion Way pour l'AJD, « Connaissance et attitude des parents d'enfants de moins de 15 ans vis-à-vis du diabète des enfants », septembre 2024